

Ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika noteiktām lokalizācijām

(Pielikums MK [27.09.2016.](#) noteikumu Nr. 642 redakcijā, kas grozīta ar MK [20.12.2016.](#) noteikumiem Nr. 839)

Audzēja lokalizācijas vieta (diagnozes kods atbilstoši SSK-10 ar atvasinātajām klasifikācijām)	Ģimenes ārsta apmeklējuma laikā*		Ļaundabīgo audzēju primārie diagnostiskie izmeklējumi			Speciālists, pie kura konsultācijas saņemšanai nosūta personu ar konstatētu atradi
	sūdzību un simptomu izvērtēšana	fizikāla izmeklēšana un anamnēzes noskaidrošana	laboratoriskie izmeklējumi	vizuālās diagnostikas izmeklējumi	citi izmeklējumi	
1	2	3	4	5	6	7
1. Krūts (Z03.150)	1.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus: 1.1.1. pacientei vecumā no 30 gadiem ir neskaidrs veidojums krūtī ar/bez sāpēm; 1.1.2. pacientei vecumā no 30 gadiem ir veidojums padusē;	1.2. Veic šādas pārbaudes: 1.2.1. krūšu un padušu apvidus apskati (deformācija, asimetrija, iztilpums, ievilkums, krūtsgala pārmaiņas); 1.2.2. krūšu un limfmezglu palpāciju,	1.3. Netiek veikti	1.4. Veic šādus izmeklējumus: 1.4.1. diagnostisko ultrasonogrāfiju sievietei līdz 35 gadu vecumam; 1.4.2. diagnostisko mamogrāfiju sievietei vecumā no 35 gadiem; 1.4.3. diagnostisko mamogrāfiju sievietei līdz 35 gadu vecumam gadījumos, ja iepriekšējos ultrasonogrāfijas izmeklējumos ir bijušas aizdomas par patoloģiju, kas nav	1.5. Netiek veikti	1.6. Nosūta pie ķirurga, kurš specializējies krūts slimību ārstēšanā, uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm: 1.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitāte"

	<p>1.1.3. pacientei vecumā no 50 gadiem ir sūdzības saistībā ar viena krūts gala:</p> <p>1.1.3.1. izdalījumiem;</p> <p>1.1.3.2. ievilkumiem;</p> <p>1.1.3.3. citām pārmaiņām vai sūdzībām</p>	<p>pārbaudot, vai nav:</p> <p>1.2.2.1. veidojumu vienā vai abās krūtīs, ar paceltām un nolaistām rokām;</p> <p>1.2.2.2. palielinātu limfmezglu vienā vai abās pusēs;</p> <p>1.2.2.3. palielinātu limfmezglu zem vai virs atslēgkaula vienā vai abās pusēs</p>		pārliecinoši labdabīga		<p>slimnīca";</p> <p>1.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>1.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>1.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>1.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
2. Priekšdziedzis (Z03.161)	2.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus pacientiem vecumā no 45 gadiem vai no 40 gadiem, ja ģimenes anamnēzē	2.2. Veic digitāli rektālu priekšdziedzera palpāciju, pārbaudot, vai nav izmainīta prostata (forma, konsistence,	2.3. Veic prostatas specifiskā antigēna un brīvā prostatas specifiskā antigēna koncentrācijas un dinamikas noteikšanu atbilstoši apstiprinātajām	2.4. Veic transrektālu ultrasonoskopiju ar biopsiju	2.5. Netiek veikti	2.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:

	<p>ir priekšdziedzera vēzis:</p> <p>2.1.1. urinācijas traucējumi, kuri izpaužas šādi:</p> <p>2.1.1.1. biežāka urinācija;</p> <p>2.1.1.2. urinācija naktī;</p> <p>2.1.1.3. strūklas pavājināšanās;</p> <p>2.1.1.4. spiedoša vajadzība urinēt;</p> <p>2.1.1.5. urīna retence;</p> <p>2.1.1.6. grūtības uzsākt urināciju;</p> <p>2.1.1.7. biežas urīnceļu infekcijas;</p> <p>2.1.1.8. makrohematurija</p>	<p>lielums, sāpīgums, virsma)</p>	<p>klīniskajām vadlīnijām</p>			<p>2.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>2.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>2.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>2.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"</p>
--	--	-----------------------------------	-------------------------------	--	--	---

<p>3. Āda, izņemot melanomu (Z03.144)</p>	<p>3.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>3.1.1. ilgstoši nedzīstošs ādas pušums, plaisājums, apsārtums, zvīņošanās, kreveļošana;</p> <p>3.1.2. nesāpīgs ādas izcīlnis (perlamutrveida mezgliņš), kas pakāpeniski palielinās, veidojums ar vaļņveida maliņām;</p> <p>3.1.3. teleangiektāzijas pa veidojuma perifēriju</p>	<p>3.2. Veic visa ķermeņa ādas apskati, pārbaudot, vai nav patoloģisku veidojumu uz ķermeņa ādas</p>	<p>3.3. Veic ādas nospieduma citoloģisku izmeklēšanu</p>	<p>3.4. Netiek veikti</p>	<p>3.5. Netiek veikti</p>	<p>3.6. Nosūta pie ķirurga vai mutes, sejas un žokļu ķirurga, ja ādas veidojuma lokalizācija ir uz sejas, uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>3.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>3.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>3.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā</p>
---	---	--	--	---------------------------	---------------------------	--

						<p>slimnīca";</p> <p>3.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>3.6.5. SIA "Piejūras slimnīca";</p>
<p>4. Resnā un taisnā zarna (Z03.118; Z03.119; Z03.120)</p>	<p>4.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>4.1.1. pacientam vecumā no 40 gadiem ir svara zudums bez konstatēta iemesla un sāpes vēderā;</p> <p>4.1.2. pacientam vecumā no 50 gadiem ir neizskaidrojami asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas;</p>	<p>4.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>4.2.1. ādas novērtēšanu (anēmija, dzelte, turgors);</p> <p>4.2.2. vēdera palpāciju (sāpīgums, veidojumi);</p> <p>4.2.3. aknu apvidus palpāciju (sāpīgums, aknu robežas, aknu malas virsma, konsisten</p>	<p>4.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>4.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p> <p>4.3.1.1. anēmijas;</p> <p>4.3.1.2. leukocitozes;</p> <p>4.3.1.3. palielināta eritrocītu grimšanas ātruma;</p> <p>4.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts:</p> <p>4.3.2.1. feritīns;</p> <p>4.3.2.2. alanīnaminotransferāze;</p>	<p>4.4. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>4.4.1. rentgenkontrastizmeklēšana ar bāriju;</p> <p>4.4.2. kolonoskopija ar biopsiju</p>	<p>4.5. Netiek veikti</p>	<p>4.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>4.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>4.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes</p>

	<p>4.1.3. pacientam vecumā no 60 gadiem ir dzelzs deficīta anēmija un/vai vēdera izejas traucējumi;</p> <p>4.1.4. pacientam vecumā līdz 50 gadiem (ieskaitot) ir asiņaini izdalījumi no taisnās zarnas un kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>4.1.4.1. sāpes vēderā;</p> <p>4.1.4.2. vēdera izejas traucējumi;</p> <p>4.1.4.3. svara zudums;</p> <p>4.1.4.4. dzelzs deficīta anēmija;</p> <p>4.1.5. taustāms veidojums vēderā vai</p>	<p>ce, izmēri);</p> <p>4.2.4. cirkšņu limfmezglu palpāciju</p>	<p>4.3.2.3. sārmainā fosfatāze;</p> <p>4.3.2.4. laktātdehidrogenāze;</p> <p>4.3.2.5. kreatinīns;</p> <p>4.3.3. nosaka, vai nav slēptu asiņu fēcēs</p>			<p>slimnīca";</p> <p>4.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>4.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>4.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
--	---	--	---	--	--	---

	taisnajā zarnā					
5. Bronhi un plaušas (Z03.134)	<p>5.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>5.1.1. pacientam ir neizskaidrojama asiņu atklepošana (punktiņi, stīdziņas, putaini rozā krēpas, asiņu recekļi);</p> <p>5.1.2. smēķētājam vai bijušajam smēķētājam ar 30 paciņģadu smēķēšanas anamnēzi, kuri ir vecumā no 50 gadiem, novēro:</p> <p>5.1.2.1. persistējošu klepu ilgāk par trijām nedēļām vai novēro klepus</p>	<p>5.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>5.2.1. plaušu salīdzinošo perkusiju un auskultāciju;</p> <p>5.2.2. noskaidro smēķēšanas anamnēzi, iegūstot informāciju:</p> <p>5.2.2.1. no kāda vecuma smēķē vai smēķējis;</p> <p>5.2.2.2. cik cigarešu dienā smēķē vai smēķējis;</p> <p>5.2.2.3. paciņģadu skaitu (cigarešu skaits dienā, reizināts ar smēķēšanas</p>	<p>5.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>5.3.1. nosaka pilnu asinsainu;</p> <p>5.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīta:</p> <p>5.3.2.1. alanīnaminotransferāze;</p> <p>5.3.2.2. C reaktīvais olbaltums;</p> <p>5.3.3. veic krēpu (ja tādas ir) mikrobioloģisko izmeklēšanu uz <i>M. tuberculosis</i></p>	<p>5.4. Veic krūšu kurvja orgānu rentgenogrāfiju</p>	<p>5.5. Netiek veikti</p>	<p>5.6. Nosūta pie pneimologa vai torakālā ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>5.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>5.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>5.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p>

	<p>rakstura pārmaiņas;</p> <p>5.1.2.2. sāpes krūtīs (elpojot, klepojot);</p> <p>5.1.2.3. aizdusu;</p> <p>5.1.2.4. sācošu elpošanu;</p> <p>5.1.2.5. persistējošu vai recidivējošu dziļo elpceļu (plaušu) infekciju;</p> <p>5.1.2.6. svāra zudumu;</p> <p>5.1.3. pacientam persistē vairāk nekā divi šādi simptomi un sūdzības bez konstatēta iemesla:</p> <p>5.1.3.1. smēķētājs vai bijušais smēķētājs;</p> <p>5.1.3.2. klepus</p>	<p>as ilgumu gados);</p> <p>5.2.3. noskaidro arodkaitīgumu (azbests);</p> <p>5.2.4. noskaidro saslimstību ar ļaundabīgiem audzējiem ģimenē;</p> <p>5.2.5. precīzi, kad iepriekš veikti krūšu kurvja orgānu radioloģiskie izmeklējumi un kādi bija to rezultāti</p>				<p>5.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"</p>
--	---	--	--	--	--	---

<p>ilgāk par trijām nedēļām vai novēro klepus rakstura pārmaiņas;</p> <p>5.1.3.3. sāpes krūtīs vai plecos (elpojot, klepojot);</p> <p>5.1.3.4. aizdusa;</p> <p>5.1.3.5. sāpīga elpošana;</p> <p>5.1.3.6. persistējošas vai biežas dziļas elpceļu (plaušu) infekcijas;</p> <p>5.1.3.7. paaugstināta ķermeņa temperatūra;</p> <p>5.1.3.8. svara zudums;</p> <p>5.1.3.9. apetītes zudums;</p> <p>5.1.3.10. nogurums, nespēks;</p>					
--	--	--	--	--	--

	5.1.3.11. pulkstensti kla nagi;					
	5.1.3.12. palielināti kakla vai virs vai zem atslēgas kaula limfmezgli					
6. Kuņģis (Z03.116)	6.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus : 6.1.1. disfāģija; 6.1.2. pacientam vecumā no 55 gadiem ir svara zudums un kāds no šādiem simptomie m: 6.1.2.1. sāpes epigastrijā, tai skaitā kombinācij ā ar zemu hemoglobī na līmeni; 6.1.2.2. gastroezof ageālā atviļņa slimība;	6.2. Veic šādas pārbaude s: 6.2.1. ādas novērtēša nu (bālums, dzelte, kaheksija, turgors); 6.2.2. kakla, zem un virsatslēg kaula, kā arī paduses limfmezg lu palpāciju; 6.2.3. vēdera palpāciju (sāpīgum s, veidojum i); 6.2.4. aknu apvidus palpāciju (aknu robežas,	6.3. Veic šādus izmeklējumus: 6.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav: 6.3.1.1. anēmijas; 6.3.1.2. leikocitozes; 6.3.1.3. trombocitozes; 6.3.1.4. palielināta eritrocītu grimšanas ātruma; 6.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts: 6.3.2.1. feritīns; 6.3.2.2. gammaglutamīntr ansferāze;	6.4. Veic šādus izmeklējumus: 6.4.1. rentgenkontrastiz meklēšana ar bāriju; 6.4.2. gastroskopija ar biopsiju	6.5. Netiek veikti	6.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecī bas iestādēm : 6.6.1. SIA "Rīgas Austrum u klīniskā universit ātes slimnīca "; 6.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universit ātes slimnīca "; 6.6.3. SIA "Daugav pils

	<p>6.1.3. pacientam vecumā no 55 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>6.1.3.1. dispepsija, tai skaitā, ja tā nepadodas ārstēšanai;</p> <p>6.1.3.2. trombocitose, tai skaitā kombinācijā ar šķebināšanu, vemšanu, svara zudumu, gastroezofageālā atviļņa slimību, dispepsiju vai sāpēm epigastrijā;</p> <p>6.1.3.3. šķebināšana un vemšana, tai skaitā kombinācijā ar svara zudumu, gastroezofageālā atviļņa slimību, dispepsiju</p>	<p>aknu malas virsma, konsistence, izmēri)</p>	<p>6.3.2.3. alanīnaminotransferāze;</p> <p>6.3.2.4. sārmainā fosfatāze;</p> <p>6.3.2.5. laktātdehidrogenāze;</p> <p>6.3.2.6. kreatinīns</p>			<p>reģionālā slimnīca";</p> <p>6.6.4. SIA "Liepāja slimnīca";</p> <p>6.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
--	--	--	---	--	--	---

	<p>vai sāpēm epigastrijā;</p> <p>6.1.4. asiņu atvemšana</p>					
<p>7. Nieres (Z03.164; Z03.165)</p>	<p>7.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>7.1.1. pacientam vecumā no 45 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>7.1.1.1. neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas urīnceļu infekcijas;</p> <p>7.1.1.2. persistējoša makrohematūrija, tai skaitā tās periodiska atkārtošanās pēc urīnceļu infekcijas izārstēšanas;</p> <p>7.1.2. sārts urīns;</p>	<p>7.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>7.2.1. nieru apvidus palpāciju un apklauvēšanu;</p> <p>7.2.2. padušu un cirkšņu limfmezglu palpāciju</p>	<p>7.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>7.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p> <p>7.3.1.1. anēmijas;</p> <p>7.3.1.2. leukocitozes;</p> <p>7.3.1.3. palielināta eritrocītu grimšanas ātruma;</p> <p>7.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts:</p> <p>7.3.2.1. kreatinīns;</p> <p>7.3.2.2. glomerulu filtrācijas ātrums;</p> <p>7.3.2.3. laktātdehidrogenāze;</p> <p>7.3.3. veic urīna analīzi, pārbaudot eritrocītu vai baktēriju esību, kā arī citoloģisku izmeklēšanu</p>	<p>7.4. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>7.4.1. veic vēdera dobuma ultrasonogrāfiju;</p> <p>7.4.2. vēdera dobumu orgānu datortomogrāfiju ar kontrastvielas ievadīšanu, ja ultrasonogrāfijā izmaiņas nekonstatē, bet saglabājas simptomi, sūdzības un ir laboratoriska atradne</p>	<p>7.5. Netiek veikti</p>	<p>7.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>7.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>7.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>7.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p>

	7.1.3. sāpes sānos					7.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
8. Urīnpūslis (Z03.167)	<p>8.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>8.1.1. pacientam vecumā no 45 gadiem ir kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>8.1.1.1. neizskaidrojama makrohematūrija bez konstatētas urīnceļu infekcijas;</p> <p>8.1.1.2. persistējoša vai periodiska makrohematūrija pēc urīnceļu infekcijas izārstēšanas;</p> <p>8.1.2. pacientam vecumā no 60 gadiem</p>	<p>8.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>8.2.1. ādas novērtēšanu (bālums, kaheksija, turgors);</p> <p>8.2.2. vēdera palpāciju (sāpīgums, veidojumi);</p> <p>8.2.3. cirkšņu limfmezģļu palpāciju</p>	<p>8.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>8.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p> <p>8.3.1.1. anēmijas;</p> <p>8.3.1.2. leukocitozes;</p> <p>8.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts:</p> <p>8.3.2.1. feritīns;</p> <p>8.3.2.2. sārmainā fosfatāze (SF);</p> <p>8.3.2.3. laktātdehidrogenāze; 8.3.2.4. kreatinīns;</p> <p>8.3.2.5. CRO kvantitatīvi;</p> <p>8.3.3. veic urīna analīzi, pārbaudot šūnu rādītājus (leikocīti, eritrocīti (mikro vai makrohematūrija)), kā arī</p>	<p>8.4. Veic vēdera dobuma un mazā iegurņa dobuma orgānu ultrasonogrāfiju</p>	<p>8.5. Cistoskopija</p>	<p>8.6. Nosūta pie urologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>8.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>8.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>8.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā</p>

	<p>ir kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>8.1.2.1. neizskaidrojama mikrohematūrija un dizūrija;</p> <p>8.1.2.2. leikocitoze;</p> <p>8.1.3. atkārtotas un biežas urīnceļu infekcijas pacientam vecumā no 60 gadiem;</p> <p>8.1.4. pūšļa nepilnīgas iztukšošanās sajūta</p>		<p>citoloģisku izmeklēšanu (atipiskas vai audzēja šūnas)</p>			<p>slimnīca";</p> <p>8.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"</p>
<p>9. Aizkuņģa dziedzeris (Z03.125)</p>	<p>9.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>9.1.1. pacientam vecumā no 40 gadiem ir dzelte;</p> <p>9.1.2. pacientam vecumā no 60 gadiem ir svara</p>	<p>9.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>9.2.1. ādas novērtēšanu (dzelte, kaheksija, bālums, turgors);</p> <p>9.2.2. vēdera palpāciju (sāpīgums,</p>	<p>9.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>9.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p> <p>9.3.1.1. anēmijas;</p> <p>9.3.1.2. leikocitozes;</p> <p>9.3.1.3. palielinātu eritrocītu</p>	<p>9.4. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>9.4.1. vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfiju;</p> <p>9.4.2. vēdera dobuma datortomogrāfiju ar kontrastvielas ievadīšanu, ja konstatētas izmaiņas laboratoriskos izmeklējumos un vēdera dobuma ultrasonogrāfijā</p>	<p>9.5. Netiek veikti</p>	<p>9.6. Nosūta pie ķirurga uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>9.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universit</p>

	<p>zudums un kāds no šādiem simptomiem:</p> <p>9.1.2.1. caureja;</p> <p>9.1.2.2. sāpes mugurā;</p> <p>9.1.2.3. sāpes vēderā;</p> <p>9.1.2.4. šķebinašana;</p> <p>9.1.2.5. vemšana;</p> <p>9.1.2.6. aizcietējums;</p> <p>9.1.2.7. nesen sācies diabēts</p>	<p>veidojumi);</p> <p>9.2.3. aknu apvidus palpāciju (aknu malas virsma, konsistence, izmēri, aknu robežas)</p>	<p>grimšanas ātruma;</p> <p>9.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts:</p> <p>9.3.2.1. bilirubīns;</p> <p>9.3.2.2. ALAT – alanīnaminotransferāze;</p> <p>9.3.2.3. gammaglutamīntransferāze;</p> <p>9.3.2.4. sārmainā fosfatāze;</p> <p>9.3.2.5. laktātdehidrogenāze;</p> <p>9.3.2.6. kreatinīns;</p> <p>9.3.2.7. glikozes līmenis asinīs;</p> <p>9.3.3. veic koprogrammu, lai pārbaudītu, vai nav steatorejas</p>			<p>ātes slimnīca";</p> <p>9.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>9.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>9.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>9.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
10. Dzemdē ķermenis (Z03.154)	<p>10.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>10.1.1. neizskaidrojama vagināla</p>	<p>10.2. Veic šādas pārbaudes:</p> <p>10.2.1. ādas novērtēšanu (bālums, dzelte,</p>	<p>10.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>10.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p>	10.4. Veic transvaginālu ultrasonogrāfiju	10.5. Netiek veikti	10.6. Nosūta pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa uz kādu no šādām ārstniecī

	<p>asiņošana menopauzē (vairāk nekā 12 mēnešus pēc pēdējām menstruācijām);</p> <p>10.1.2. pacientei vecumā no 55 gadiem ir neskaidri izdalījumi no maksts, kurus:</p> <p>10.1.2.1. konstatē pirmo reizi menopauzē ;</p> <p>10.1.2.2. pavada trombocitozē;</p> <p>10.1.2.3. pavada mikro vai makrohematūrija;</p> <p>10.1.3. pacientei vecumā no 55 gadiem ir makrohematūrija, tai skaitā ar kādu no šādiem simptomiem :</p>	<p>tūskainība, aptaukošanās);</p> <p>10.2.2. vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpāciju</p>	<p>10.3.1.1. anēmijas;</p> <p>10.3.1.2. trombocitozes;</p> <p>10.3.1.3. palielināta eritrocītu grimšanas ātruma;</p> <p>10.3.2. veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīta:</p> <p>10.3.2.1. sārmainā fosfatāze;</p> <p>10.3.2.2. laktātdehidrogenāze;</p> <p>10.3.2.3. kreatinīns;</p> <p>10.3.2.4. glikozes līmenis asinīs</p>			<p>bas iestādēm :</p> <p>10.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>10.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>10.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>10.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>10.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
--	---	--	---	--	--	---

	<p>10.1.3.1. zems hemoglobīna līmenis;</p> <p>10.1.3.2. trombocitozē;</p> <p>10.1.3.3. paaugstināts glikozes līmenis</p>					
11. Olnīcas (Z03.156)	<p>11.1. Konstatē šādas sūdzības vai simptomus:</p> <p>11.1.1. sāpes vēderā, pilnuma sajūta, vēdera pūšanās;</p> <p>11.1.2. vēdera apjoma palielināšanās bez svara palielinājuma;</p> <p>11.1.3. taustāms veidojums vēderā;</p> <p>11.1.4. pacientei vecumā no 50 gadiem ir kāds no šādiem</p>	<p>11.2. Veic vēdera lejas daļas un cirkšņu apvidus palpāciju</p>	<p>11.3. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>11.3.1. nosaka pilnu asinsainu un eritrocītu grimšanas ātrumu un izvērtē, vai nav:</p> <p>11.3.1.1. anēmijas;</p> <p>11.3.1.2. leukocitozes;</p> <p>11.3.1.3. palielināta eritrocītu grimšanas ātruma;</p> <p>11.3.2 veic asins bioķīmisko analīzi un izvērtē, vai nav izmainīts:</p> <p>11.3.2.1. α – fetoproteīns;</p> <p>11.3.2.2. sārmainā fosfatāze;</p>	<p>11.4. Veic šādus izmeklējumus:</p> <p>11.4.1. vēdera un iegurņa dobuma orgānu ultrasonogrāfiju;</p> <p>11.4.2. vēdera un iegurņa dobumu orgānu datortomogrāfiju, ja konstatēts paaugstināts audzēju marķieris CA-125 un citos izmeklējumos konstatētas izmaiņas</p>	<p>11.5. Netiek veikti</p>	<p>11.6. Nosūta pie ginekologa vai onkoloģijas ginekologa uz kādu no šādām ārstniecības iestādēm:</p> <p>11.6.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";</p> <p>11.6.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes</p>

	<p>simptomie m (biežāk par 12 reizēm mēnesī):</p> <p>11.1.4.1. vēdera pūšanās;</p> <p>11.1.4.2. priekšlaiku s sāta sajūtas iestāšanās un apetītes samazināšanās;</p> <p>11.1.4.3. sāpes vēderā vai iegurnī;</p> <p>11.1.4.4. biežāka urinēšana vai spiedoša vajadzība;</p> <p>11.1.5. neizskaidrojams svāra zudums, nespēks, nogurums un vēdera izejas pārmaiņas;</p> <p>11.1.6. vismaz divām pirmās vai otrās pakāpes radniecēm</p>		<p>11.3.2.3. laktātdehidrogenāze;</p> <p>11.3.2.4. audzēju marķieris CA-125</p>			<p>slimnīca";</p> <p>11.6.3. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca";</p> <p>11.6.4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca";</p> <p>11.6.5. SIA "Piejūras slimnīca"</p>
--	--	--	---	--	--	--

	ir bijis olnīcu vai krūts vēzis līdz 50 gadu vecumam					
--	---	--	--	--	--	--

*Nosacījumi attiecas arī uz ieslodzījuma vietas ārstiem.