

Balstvakcinācija pret Covid-19

ar pielāgotajām vakcīnām*

Pabeigts primārās vakcinācijas kurss un veikta balstvakcinācija būtiski samazina smagu slimības, hospitalizācijas un nāves risku no Covid-19. Nav sarežģītu Covid-19 vakcinācijas algoritmu, bet ir **vienas balstvakcinācijas princips.**

Kur saņemt vakcināciju?



Savā ģimenes ārsta praksē vai ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetā!

Kam iesaka vakcinēties pret Covid-19?



Vakcinācija rekomendējama visai sabiedrībai.

Kad vakcinēties ar pielāgoto vakcīnu?

3 mēnešus pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas – cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem,



6 mēnešus pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas – visiem pārējiem iedzīvotājiem,



1 mēnesi pēc pārslimošanas ar Covid-19.



Stingri rekomendējama:

- imūnsupresētiem cilvēkiem no 5 gadu vecuma un viņu ciešām kontaktpersonām,
- ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam,
- senioriem vecumā no 65 gadiem,
- veselības aprūpes personālam,
- cilvēkiem ar hroniskām slimībām no 5 gadu vecuma,
- grūtniecēm.

Vakcinācijas devu skaits

Iepriekš saņemtās Covid-19 vakcīnas devas	0 devas	1 deva	2 devas un vairāk
Jāsaņem pielāgotās Covid-19 vakcīnas	2 devas	1 deva	1 deva

Pārslimošanas fakts NETIEK pielīdzināts vienai vakcīnas devai.



***Pielāgotās vakcīnas** – oriģinālajām vakcīnām sekojoši reģistrētās Covid-19 vakcīnas, kur kā imunizējošie antigēni kombinācijā ar *Wuhan* variantu, izmantoti SARS CoV-2 epidemioloģiski aktuālie SARS CoV-2 vīrusa varianti.



Oriģinālās vakcīnas – jau reģistrētās Covid-19 vakcīnas, kuru sastāvā kā imunizējošais antigēns izmantots tikai SARS CoV-2 vīrusa *Wuhan* varianta pīķa proteīns.