

PROSTATAS VĒŽA SKRĪNINGS



Prostatas vēža skrīnings - profilaktiska pārbaude prostatas vēža savlaicīgai atklāšanai, asins analizēs nosakot Prostatas specifisko antigēnu



Pārbaudi reizi divos gados var veikt vīrieši 50 - 75 gadu vecumā (un 45 - 50 gados, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradniekam)



Lai veiktu pārbaudi, jāvēršas ģimenes ārsta praksē, kur izsniegs nosūtījumu asins parauga nodošanai laboratorijā



Profilaktisko pārbaudi veic bez maksas

- Asins parauga nodošanu var veikt jebkurā laboratorijā, kurā nodrošina valsts apmaksātus izmeklējumus. Pirms došanās uz laboratoriju ar to ieteicams sazināties, lai pārliecinātos, ka šobrīd tajā veic prostatas specifiskā antigēna noteikšanu.
- Profilaktisko pārbažu veikšana sniedz iespēju regulāri uzraudzīt veselības stāvokli un savlaicīgi atklāt izmaiņas, tādējādi nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk uzsākt ārstēšanu, lai sasniegtu labākus ārstēšanas rezultātus.



LATVIJĀ PRIEKŠDZIEDZERA JEB PROSTATAS VĒZIS IR VISBIEŽĀK SASTOPAMĀIS VĪRIEŠU URĪNIZVADSISTĒMAS UN DZIMUMORGĀNU SISTĒMAS AUDZĒJS, KĀ ARĪ OTRAIS IZPLATĪTĀKAIS ĻAUNDABĪGAIS AUDZĒJS VĪRIEŠIEM PĒC 40 GADU VECUMA. RISKS SASLIMT AR ŠO SLIMĪBU PIEAUG DIVAS REIZES, JA PROSTATAS VĒZIS BIJIS KĀDAM ASINSRADNIEKAM.

KĀPĒC VEIKT PĀRBAUDI?

PROSTATAS SKRĪNINGA VEIKŠANA IR SVARĪGA, JO:

- tā sniedz iespēju savlaicīgi atklāt izmaiņas;
- savlaicīgas diagnozes noteikšana un ārstēšanas uzsākšana sniedz labākus ārstēšanās rezultātus.

RAKSTURĪGĀKIE PROSTATAS VĒŽA SIMPTOMI UN SŪDZĪBAS:

- urinēšanas traucējumi;
- urīns sātā vai sarkanā krāsā;
- asins piejaukums pie spermas;
- erektila disfunkcija vai impotence;
- diskomforts sēžot, saistībā ar palielinātu priekšdziedzeri;
- neizskaidrojams svara zudums;
- sāpes mugurā, iegurņa, ekstremitāšu kaulos;
- dedzinoša sajūta vai tūska kājās, vai pēdās;
- nespēks;
- vēdera izejas izmaiņas.

KUR UZZINĀT VAIRĀK?



Ģimenes ārsta praksē



Zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234



Tīmekļvietnē
www.vmnvd.gov.lv/lv/skrinings